

لمحة عن شلل الأطفال

الأطفال أثناء مرحلة الطفولة، فإنه يصبح معرضاً لخطر الإصابة بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال في وقت لاحق من الحياة، مما يسبب مشاكل صحية متزايدة. يتعلق الأمر بشكل أساسي بالأشخاص القادمين من الشرق الأوسط أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا.

يجب إحالة أي شخص مصاب بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال أو ظهرت عليه أعراض متلازمة ما بعد شلل الأطفال إلى عيادة طب إعادة التأهيل، التي لديها معرفة متخصصة بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال، لإجراء مزيد من الفحص والتقييم. لذلك، يجب عليك أن تتبّه أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى الأعراض التي يمكن ربطها بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال.

ينجم شلل الأطفال عن فيروس معدي يؤثر على الجهاز العصبي. يمكن لهذا الفيروس أن يتلف الأعصاب ويؤدي إلى الشلل. يعاني البعض من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا عندما يُصابون بهذا الفيروس، والبعض الآخر لا تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق. لذلك، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت قد أصبت بشلل الأطفال عندما كنت طفلاً أم لا، فالفيروس يصيب الأطفال والشباب بشكلٍ أساسي.

على الرغم من القضاء على مرض شلل الأطفال في السويد، إلا أن الأشخاص القادمين من الدول الأخرى إلى السويد، قد يكونون قد أُصيبوا بشلل الأطفال عندما كانوا أطفالاً، وأحياناً لن تتمكن من اكتشاف ذلك بنفسك. عند إصابة الشخص بشلل

لمحة عن متلازمة ما بعد شلل الأطفال

التنفّس وصعوبة في البلع. قد تشعر أيضاً في حالة الإصابة بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال بضعف متزايد في العضلات التي كانت تعمل بشكل طبيعي في السابق. يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في تحمل البرد والشعور بالتجمد بسهولة. قد تعاني أيضاً من ضعف في الصوت إذا ضعفت عضلات حلقك. غالباً ما تزداد الأعراض سوءاً بمرور الوقت، ولكن هذا يحدث ببطء شديد.

يتعرض الأشخاص المصابون بشلل الأطفال لخطر الإصابة بضعف عضلي جديد، حتى لو لم يتعرضوا للإصابة بشلل كبير من قبل. وهذا ما يسمى بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال (PPS)، أو أعراض ما بعد شلل الأطفال. تشير التقديرات إلى أن نصف الذين أُصيبوا سابقاً بشلل الأطفال أُصيبوا بعد ذلك بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال في وقت لاحق من حياتهم.

يمكن أن تتمثل أعراض ما بعد شلل الأطفال في ألم في العضلات والمفاصل وإرهاق ومشاكل في